AS AVES DA RPPN CERRADÃO

RIQUEZA, COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTAS DAS ESPÉCIES DE AVES DA PRINCIPAL RESERVA PARTICUALR DA SERRA DA CANASTRA

Este estudo mostra os resultados preliminares do levantamento de avifauna realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural da Cachoeira do Cerradão, localizada na Serra da Canastra em Minas Gerais, uma das poucas unidades de conservação da região, além do parque nacional.

O Brasil possui a avifauna mais rica do mundo, com cerca de 1970 espécies. Em Minas Gerais, são reconhecidas 753 espécies de aves, o que representa aproximadamente 46% da avifauna brasileira. No Estado, a região da Serra da Canastra merece destaque, pois conta com 403 espécies oficialmente registradas, mais de 50% do total de Minas Gerais.

A RPPN Cerradão está inserida nos domínios do Cerrado e da Zona Geográfica de "contatos/enclaves" com a Floresta Atlântica, constuindo uma das principais unidades de conservação na região da Serra da Canastra. Apesar disso, nenhum levantamento avifaunístico mais completo havia sido realizada na RPPN até o momento.

Para compor esse inventário, diferentes fitofisiomias foram investigadas (mata, campo, cerrado), durante 14 campanhas de campo, totalizando 44 horas, entre agosto de 2021 e maio de 2022.

As incursões em campo, percorreram trilhas existentes na reserva. As observações foram divididas em dois períodos diários, o primeiro iniciado logo após o nascer do sol e finalizado

NA RPPN CERRADÃO OCORREM

243 ESPÉCIES DE AVES



após quatro horas; e o segundo ao final da tarde, abrangendo as três últimas horas do dia, e em algumas ocasiões, estendendo-se até o início da noite para observação de stringideos (corujas) e caprimulgídedos (curiangos).

Além dos registros em campo, foram compiladas e analisadas listas previamente submetidas às plataformas de ciência cidadã, como o Wikiaves e o e-bird, das quais aproveitamos alguns registros de espécies com potencial ocorrência na RPPN.

Foram identificadas 243 espécies de aves, distribuídas em 22 ordens, 53 famílias e 202 gêneros. Passeriformes foi a ordem mais representativa (125 espécies, 55,07%). Entre as ordens de não-passeriformes, trochiliformes (beija-flores) foi a mais rica (14 espécies, 7,5%), o que denota a boa qualidade ambiental da reserva. Dentre os passeriformes, a família Tyrannidae apresentou o maior número de espécies (37; 16,30%). O hábito alimentar insetí-

voro predominou (97 spp; 42,73%), seguido por onívoro (57 spp, 25,11%).

Foram registradas nove espécies endêmicas do Bioma Cerrado: *Alipiopsitta xanthops, Melanopareia torquata, Antilophia galeata, Cyanocorax cristatellus, Neothraupis fasciata, Basileuterus leucophrys , Saltator atricollis, Herpsilochmus longirostris, e Porphyrospiza caerulescens.*

Sendo que *Alipiopsitta xanthops* e *Porphyrospiza caerulescens* encontram-se na lista vermelha das espécies ameaçados de extinção, conforme dados da IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Conclui-se que a riqueza da avifauna na RPPN Cachoeira do Cerradão é expressiva, reunindo mais de 60% de toda a avifauna da Serra da Canastra, que conta com 403 espécies.

A reserva é caracterizada por uma vegetação sob o domínio do Cerrado (sensu lato) tendo em seu entorno atividades agropecuáras e turísticas. O clima apresenta nítida sazonalidade, com período chuvoso de novembro a abril e seco de maio a outubro.

A RPPn apresenta diversos tipos fisionômicos como mata mesófila, cerradão, cerrado, campos e mata de galeria. A paisagem do entorno é caracterizada por pastagens, estradas e áreas de agricultura.

Constatamos que 45% das espécies habitam preferencialmente os ambientas de mata (floresta atlântica, mata mesófila e matas de galeria), 25% estão nos cerrados e apenas 8% na pequena área de campo natural da reserva. Muitas dessas espécies sofrem grande pressão, em função da fragmentação de habitat.

Além disso, a ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas reforça a importância de conservação dessa área. Acreditamos que a variedade de fitofisionomias do Cerrado, e as boas condições de preservação da maioria dos ambientes da RPPN, se constituam no principal fator determinante dessa diversidade.

ESPÉCIES DESTAQUE

Dentre as 243 espécies identificadas neste estudo, alguma se destacam como espécies de grande interesse para a prática do birdwatching, seja por sua situação endêmica, beleza da plumagem ou raridade.

Listamos a seguir, algumas espécies de interesse ornitológico que podem ser encontradas sem grande dificuldade nas trilhas da RPPN Cerradão.

SAÍRA-DOURADINHA

Tangara cyanoventris

Belíssima espécie de saíra muito comum nas áreas de Floresta Atlântica ao longo da trilha que leva à Cachoeira do Cerradão. É espécie bastante procurada por birdwatchers, especialmente os oriundos do oeste do país, por não ser comum em áreas de Cerrado.

TICO-TICO-REI-CINZA

Coryphospingus pileatus

A região da Serra da Canastra parece configurar o limite oeste para distribuição dessa espécie, que a partir de Sacramento e por toda área ocidental do país é suplantada pelo seu congênere *Coryphospingus cucullatos*. Está abundantemente presente nas áreas de Cerrado da RPPN.

ÁGUIA-CHILENA

Geranoaetus melanoleucus

Grande e poderosa ave de rapina, nidifica nos paredões que circundam a Cachoeira do Cerradão. É espécie de grande interesse para o birdwatching, bem como para a ornitologia.

SOLDADINHO

Antilophia galeata

Ave endêmica do Cerrado, muito abundante em toda a RPPN, tanto nas áreas de Cerrado quanto nas de Mata Atlântica ao longo do rio. Chama atenção pela plumagem que apresenta um topete em tom vermelho vibrante em contraste com a cor negra do restante do corpo.

VITE-VITE-DE-OLHO-CINZA

Hylophilus amaurocephalus

Ave endêmica do Brasil, está presente em alguns pontos específicos da trilha que leva à Cachoeira do Cerradão. É espécie de grande interesse para o birdwatcher que visita a Canastra por estar ausente de todo o Brasil ocidental.

ESTRELINHA-AMETISTA

Calliphlox amethystina

Minúsculo colibri, com apenas 6 cm de comprimento é um dos menores do país. Comum em toda área da RPPN, acostuma-se com bebedouros e pode se tornar espécie frequente nesses alimentadores e um grande atrativo para birdwatchers.

BICO-RETO-DE-BANDA-BRANCA

Heliomaster squamosus

Endêmico do Brasil, este beija-flor é abundante nas áreas de Cerrado nos limites da RPPN, chegando mesmo a frequentar diariamente os bebedouros instalados nas varandas da Casa do Alecrim. Pela beleza de sua plumagem, é especialmente atrativa para os observadores de aves.

MAXALALAGÁ

Micropygia schomburgkii

Essa minúscula saracura de áreas secas foi identificada na área de campo sujo entre os limites da RPPN. Devido a raridade e grande dificuldade de observação, é espécie extremamente procurada por birders de todo mundo. Com um pouco de paciência, pode se acostumar a frequentar a ceva, tornando-se mansa.

CHIFRE-DE-OURO

Heliactin bilophus

É um dos mais belos e desejados beija-flores do país. Exclusivo do Cerrado e campos naturais, é bastante exigente quanto a qualidade ambiental. Durante o levantamento avifaunistico para esse estudo, avistamos um único indivíduo visitando a flor da bolsa-de-pastor (*Zeyheria montana)* em uma área de campo sujo. Entretanto, acreditamos que a espécie pode se tornar mais frequente na RPPN, desde que haja melhor oferta florística.

TANGARAZINHO

Ilicura militaris

Espécie endêmica da Mata Atlântica brasileira, está presente em grande quantidade ao final da trilha da Cachoeira do Cerradão, onde, durante a época reprodutiva, é possível ouvir a vocalização dos machos durante praticamente todo o dia.

URUBU-REI

Sarcoramphus papa

Embora presente em quase todo o Brasil, essa colorida e imponente ave de rapina é sempre muito escassa e de difícil observação, principalmente pousada. Na RPPN Cerradão parece nidificar nos paredões no alto da Serra, e está sempre presente no entorno. Pode-se estudar inclusive a implementação de um abrigo (bird hide) exclusivo para atração e observação da espécie.

SURUCUÁ-VARIADO

Trogon surrucura

Belo e colorido pássaro das áreas florestadas, causa sempre grande interesse e emoção ao observador pelas cores metálicas da plumagem e porte relativamente grande (30 cm). Pode ser encontrado com certa facilidade nos limites da RPPN.

URUTAU

Nyctibius griseus

Ave noturna das mais curiosas do país, cercada de lendas e supersticões, chama atenção por seu comportamento mimético e pelo canto melancólico repetido lamentosamente nas noites de lua cheia. É migratório na região, onde está presente entre agosto e abril.

RPPN CERRADÃO

UM DESTINO IDEAL PARA O BIRDWATCHING

Para considerar um destino confiável e de qualidade para observação de aves, alguns requisitos devem ser observados. A RPPN Cerradão reúne os principais, a saber:

Aves de interesse ornitológico / birdwatching
-ocorrência de aves endêmicas, especiais e raras.

Informações disponíveis
- guias de campo
- listas de aves atualizadas
- guias especializados

Condições de acesso aos hábitats
-na Rppn já existe uma trilha que leva à cachoeira e que está pronta para receber observadores de aves

Estrutura / Serviços
-a estrutura existente contempla área de recepção, sanitários e trilhas já implementadas

RPPN
Cachoeira do Cerradão
São Roque de Minas - MG

ALESSANDRO ABDALA
NATUREZA • CIÊNCIA • ARTE SERRA DA CANASTRA MG - BRASIL

WWW.ALESSANDROABDALA.COM